

tus, tuberculis posticis debilibus, lateribus in medio paululum tumidis, pronoto macula nigra oculi in medio disci ornato, prosterno subtilissime albo-sericeo pubescente; elytra ante apicem arcuatim ampliata, apice conjunctim rotundata et tenuiter crenata, angulis suturalibus valde obtusis, punctis lineatim ordinatis profunde cribrata, singulatim bicostata, costis validis, parallelis et non ante apicem conjunctis; femora postica abdominis apicem paulo transeuntia; tarsi postici elongati, art. 1^o 2^{um} et 3^{um} simul sumptos aequante. — Long. 5 mill. — Assez nombreux exemplaires.

♀. *Statura paulo major; antennae subbreviores; femora postica abdominis apicem haud superantia. — Long.: 6 mill. — 3 exemplaires.*

La macule noire du pronotum est parfois assez peu marquée, et souvent même a entièrement disparu.

Cette petite espèce diffère de *D. minuta* et *D. lineigera* Chev. originaires également de Colombie et dont elle est d'ailleurs fort voisine, par la faible saillie des tubercules postérieurs du pronotum qui est orné d'une tache noire centrale chez les individus typiques, ainsi que par la couleur rousse de son abdomen.

Description d'un Curculionide nouveau de la faune française [COL.]

par A. HUSTACHE.

Gymnetron alboscuteUatum, n. sp. — Oblong, noir presque mat, base des antennes et des tibias et tarsi roux, couvert d'une pubescence fine, blanche, appliquée et éparse, condensée en une fine ligne sur les bords antérieur et postérieur du prothorax; quelques squamules blanches un peu plus épaisses sur les bords latéraux du prothorax et de la poitrine, mais éparsees, ne formant pas de tache; écusson blanc, tomenteux.

Rostre noir, peu courbé, assez épais et presque cylindrique (♀), plus épais et légèrement atténué au sommet (♂), aussi long que le prothorax (♀), que les 3 4 seulement (♂), rugueux et pubescent jusqu'à l'insertion antennaire, et de là au sommet glabre, brillant, avec des points profonds, écartés (♀), un peu pubescent (♂).

Antennes insérées vers le milieu du rostre; scape roux, brusque-

ment et fortement renflé au sommet ; 1^{er} article du funicule roux, obconique, aussi épais au sommet que le scape mais moitié aussi long ; articles suivants courts, beaucoup moins épais, 2^e rectangulaire, 3^e et 4^e globuleux, 5^e transverse, tous finement poilus au sommet ; massue ovoïde, un peu allongée, pubescente.

Tête noire, à ponctuation assez serrée, pubescente. Yeux ovales, non saillants.

Prothorax un peu transverse ; base deux fois aussi large que le bord antérieur ; bords latéraux très peu arrondis ; sa plus grande largeur près de la base ; peu convexe ; ponctuation serrée, analogue à celle de *Mecinus collaris* Germ. Écusson triangulaire, tomenteux, blanc.

Élytres un peu plus larges à la base que le prothorax et un peu plus du double de sa longueur ; épaules en angle obtus ; bords latéraux légèrement arrondis, stries fines, imperceptiblement pubescentes ; interstries plans, ponctués, à pubescence en lignes assez régulières ; 3^e strie soudée à la 8^e.

Pattes robustes, squamulées ; fémurs fortement épaissis, les antérieurs avec une petite dent ; tibias élargis, aplatis, terminés par un petit onglet. Tarses robustes ; 1^{er} article très petit. 2^e un peu plus grand, 3^e large et deux fois aussi long que le 2^e ; tous spongieux, brillant en dessous ; ongles simples, roux à extrémité noire.

Dessous noir, fortement ponctué et à squamules éparses. Une impression assez large et peu profonde sur le milieu des 2 premiers segments abdominaux. Pygidium noir à ponctuation serrée.

Long. : 2 mill.

Isère : col de l'Arc. — *Types* : ma collection.

J'ai capturé 4 exemplaires de cette nouvelle espèce dans une excursion au col de l'Arc (massif du Vercors), le 24 août 1913, en compagnie de MM. GUÉDEL et POUSSIELGUE, de Grenoble. Elle est sans doute tout à fait alpine, car les exemplaires capturés l'ont été en filochant les herbes qui avoisinent la petite source, bien connue des touristes, jaillissant immédiatement au-dessous du col, vers 1.650 m. d'altitude.

Petite espèce à placer près des *G. rostellum* Herbst, et *G. stimulosum* Germ., dont elle diffère à première vue par sa pubescence couchée, éparses ; *G. melanarium* Germ. a une pilosité analogue, mais est beaucoup plus étroit, son prothorax est différent. etc. ; *G. alboscutellatum* seul a l'écusson tomenteux, blanc.